

POLLENS

Pollens dominants	Quantité cette semaine	La semaine précédente	La même semaine en 2007
Peuplier	1288 pollens/m ³ /sem	457 pollens/m ³ /sem	240 pollens/m ³ /sem
Cupressacées	Modérée	Beaucoup plus	Beaucoup plus
Frêne	Forte	Beaucoup moins	Moins
Orme	Modérée	Moins	Moins
Aulne	Faible	Plus	Plus
Saule	Faible	Moins	Moins
Total de la semaine par m3	2733	4799	2612
RAEP = 3	Légende : 0 : Nul 1 : Très faible 2 : Faible 3 : Moyen 4 : Elevé 5 : Très élevé RAEP : Risque allergique d'exposition aux pollens		

Pollens : recueil maximum le 26 février et le minimum le 2 mars

SPORES DE MOISSURES

Moisissures principales	Moyenne journalière par m ³	La semaine précédente
Alternaria	14	Moins
Cladosporium	64	Moins
Epicoccum	1	Plus

Faible taux des spores de moisissures atmosphériques

PHENOLOGIE

Floraison	Aulne	Bouleau	Charme
	Cyprès	Peuplier	Saule
	Pariétaire/Urticacées		

Plusieurs types de conifères pollinisent. Les pariétaires pollinisent, mais pas les orties

CHU TOULOUSE

Laboratoire d'Aérobiologie : M. Hoff - J. Fabre - Y. Coulais - AM. Blanchard - S. Bayonne - P. Richard

Pneumo-allergologues : Pr A. Didier - Dr J. Dakhil


Allergo-pédiatrique : Dr F. Rancé

Laboratoire de Parasitologie - Mycologie : MD. Linas - Les techniciennes - Pr J.P Séguéla

Laboratoire de Pharmacognosie. Faculté des Sciences Pharmaceutiques : Pr I. Fourasté


Peupliers 2007

Période du 11 février au 16 mars



Peupliers 2008

Période du 11 février au 16 mars



Des rhinoconjunctivites modérées (cyprès, bétulacées).